

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILAN GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. depolama sıcaklığı +5 / +35 °C arasındadır.



Tahriş Edicidir

ÜRETİCİ FİRMA

FARMALA

GÜBRE TARIM ÜRN. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kargacı Mah. 1. Cad. No: 2 Ereğli / KONYA

Ereğli VD. 385 155 9322



farmala®

EC FERTİLİZER

VESPER

3-0-20 + ME

NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik

% W/W

Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (N-NH2)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 20
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,2

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Lisans No: 2564 Tescil No:

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toprakdan L / da (Damlama Sulama)	Yapraktan ml / da	
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Fasulye, Kavan, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çiçek) vs.	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	150 - 200 ml (195 - 268 g)	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15 - 20 gün ara ile 3-4 tekrarda uygulanır.
Tütün	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	150 - 200 ml (195 - 268 g)	1) Fide döneminde 2) İlk çapadan sonra 3) İkinci kırından sonra
Patates, Şekerpancarı, Yerfıstığı vs.	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	200 - 250 ml (260 - 325 g)	1) Çiçek öncesi 2) Çiçek sonrası
Fındık, Ceviz, Zeytin, Badem vs.	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	150 - 200 ml (195 - 268 g)	1) Çiçek öncesi 2) Meyve tutumunda
Çiçek, Kesme Çiçek, Bağ, Muz vs.	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	200 - 250 ml (260 - 325 g)	Gelişme döneminde 3-4 uygulama
Narenciye ve Diğer Tüm Meyve Ağaçları	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	200 - 250 ml (260 - 325 g)	Üç uygulama tavsiye edilmektedir: 1) Tomurcak ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2) Meyve oluşumunda 3) Hasattan sonra
Pamuk	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	150 - 200 ml (195 - 268 g)	1) 3 - 5 yapraklı iken 2) Tarak başlangıcında
Tarımsal Bitkileri	1 - 1,5 L (1,3 - 1,95 kg)	150 - 200 ml (195 - 268 g)	Karşılaşma döneminde

Üretim Tarihi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2026 2027 2028 Parti No

Son Kullanma Tarihi Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Net Ağırlık:

Net Hacim:

FARMALA GÜBRE TARIM
ÜRN. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kargacı Mah. 1. Cad. No: 2

Ereğli / KONYA

Uray VD. 385 155 9322

Şirket Vekili
Burak Kişin

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.